

ESTUDIO DE DIAMIN OXIDASA (DAO)

Instructivo para pacientes

Su médico le ha indicado este examen, el que le permitirá tomar decisiones apropiadas a su condición. Para obtener resultados confiables es fundamental que siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

REQUISITOS

- Debe suspender la ingesta de antihistamínicos una semana antes de la toma de muestra.
- No requiere ayuno.
- Se debe mantener una dieta normal una semana antes de realizarse el test, para estimar el valor basal necesario para la evaluación de los efectos de la dieta u otro tratamiento terapéutico.
- Informar a su médico tratante si ingiere alguno de los siguientes medicamentos, ya que los síntomas de intolerancia a la histamina se pueden deber a una baja actividad de la enzima DAO causada por estos medicamentos. SIEMPRE que su médico tratante así se lo indique, suspender medicación una semana antes de la toma de muestra:

TIPO MEDICAMENTO	NOMBRE MEDICAMENTO
Relajantes musculares	Pancuronio / Alcuronio / D - turbocurarina
Narcóticos	Tiopental
Analgésicos	Morfina / Petidina / Antiinflamatorios no esteroideos / Ácido Acetilsalicílico Metamizol (Dipirona)
Analgésicos locales	Prilocaína
Antihipotónicos	Dobutamina
Droga Antihipertensivas	Verapamilo / Alprenalol / Dihidralazina
Antiarrítmicos	Propafenona
Diuréticos	Amilorida
Drogas que influyen la movilidad intestinal	Metoclopramida
Antibióticos	Cefuroxima / Cefotiam / Isoniazida / Pentamidina / Ácido Clavulánico
Mucolíticos	Acetilcisteína / Ambroxol
Broncolíticos	Aminofilina
Antagonistas receptor H2	Cimetidina
Citostáticos	Ciclofosfamida
Antidepresivos	Amitriptilina